

尿沈渣 判定区分(案)

種類	説明	判定	A	B	C	D
赤血球	腎尿路疾患および全身性の出血疾患の一部にみられます。判定は算定数(以下同様)です。	B~D	1未満/HPF	1-4/HPF	5-9/HPF	10-/HPF
変形赤血球	腎臓(糸球体)で出血があった時にみられます。	C	1未満/HPF		1-/HPF	
白血球	尿路系の細菌性感染症にみられます。	B~D	1未満/HPF	1-9/HPF	10-/HPF	尿路系の臨床症状がある時
尿細管上皮細胞	腎臓内の尿細管上皮細胞が剥離したもので、腎臓疾患にみることが多いです。	D	0/WF			1-/WF
尿路上皮細胞	腎臓の一部~尿管~膀胱~尿道の一部にかけての細胞が剥離したものです。	B	1未満/HPF	1-/HPF		
扁平上皮細胞	外尿道口付近の上皮細胞が剥離したものです。	B	1未満/HPF	1-/HPF		
卵円形脂肪体	高度タンパク尿(3+以上)にみられる尿細管上皮の脂肪変性したもので、他の脂肪球含有細胞もあります。	D	0/WF			1-/WF
細胞質内封入体細胞	尿路系の炎症時に出現する変性細胞です。	C~D	0/WF		「1-/WF」 - 「1未満/HPF」	1-/HPF
核内封入体細胞	ヘルペスウイルス、サイトメガロウイルスなどのDNAウイルス感染により出現する細胞です。	D	0/WF			1-/WF
異型細胞	がんを疑う細胞。	D	0/WF			1-/WF
円柱	円柱は辺縁が並行で両端が丸くなったもので、腎疾患の目安です。下記のように多くの種類があります。					
硝子円柱	タンパクの一種が尿細管腔で貯留したもので、健常人でも激しい運動後にみることがあります。	B~C	0/WF	1-4/WF	5-/WF	
上皮円柱	尿細管の傷害により剥離した尿細管上皮細胞が封入された円柱です。	D	0/WF			1-/WF
顆粒円柱	上皮円柱が尿路内で徐々に崩壊された円柱です。腎機能低下と関係が深いです。	D	0/WF			1-/WF
ろう様円柱	尿細管腔の長期閉塞により顆粒円柱が徐々に崩壊した太い円柱で、慢性腎不全にみることがあります。	D	0/WF			1-/WF
脂肪円柱	脂肪球や卵円形脂肪体を含んだ円柱です。尿タンパク量が多い場合にみられます。	D	0/WF			1-/WF
赤血球円柱	腎臓(糸球体)で出血があった時にみることの多い赤血球を含有した円柱です。	D	0/WF			1-/WF
白血球円柱	白血球を多く含んだ円柱で、糸球体腎炎や腎盂腎炎の活動が考えられます。	D	0/WF			1-/WF
空胞変性円柱	円柱内に大小の空胞が認められる円柱で、糖尿病性腎症および重症腎障害にみられます。	D	0/WF			1-/WF
塩類・結晶円柱	リン酸塩や尿酸の塩類、シュウ酸カルシウム結晶などを封入した円柱。	B	0/WF	1-/WF		
細菌	細菌がみられ、尿路感染症が疑われます。同時に白血球がなければ問題はありません。	B	-	1+以上		
真菌	カビの一種で特別な治療を行わなくても消失しますが、糖尿病など免疫機能低下がある時は要注意です。	B	-	1-/WF		
原虫	性感染症の原因となるトリコモナスなどの原虫がいます。治療が必要となります。	D	0/WF			1-/WF

略語

HPF (high power field) 、 WF (whole field)