

# 会 告

## 一判定区分の改訂等について一

2022 年 4 月より判定区分に関する表記の改訂を実施し，脚注の追加を行います。

### 1. 判定区分の表記の改訂

(旧判定区分)

A異常なし	B軽度異常	C要経過観察 (生活改善・再検査)	D要医療 D1 要治療 D2 要精検	E 治療中
-------	-------	----------------------	-----------------------	----------



(2022 年度 4 月 新判定区分)

A 異常なし	B 軽度異常	<u>C</u> 要再検査・生活改善	<u>D</u> 要精密検査・治療	E 治療中
-----------	-----------	-----------------------	----------------------	----------

### 2. 改訂の理由等

「C：要再検査・生活改善」

C 要経過観察の表現を改訂する。X か月後など再検査時期を明記し，受診者行動を明確に指示する。画像検査・生理検査などは 1 年後の再検査としてもよい。なお経過観察，定期的検査，症状あれば受診，などの不明瞭な記載は行わない。血圧は健診機関での再検査よりも家庭血圧測定を推奨する。

「D：要精密検査・治療」

D 要医療の表現を改訂する。精密検査を行うか，治療を行うかは，紹介先が決定することになるため D1，D2 を併合する。値の高低・所見によって要精密検査，要治療を使い分けしてもよい。

### 3. 脚注追加の理由等

#### 3-1 non-HDL コレステロールの判定区分適応

・厚生労働省 特定健康診査

標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】 第 2 編別紙[4,371KB]

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html>

の 2-49 ページ，non-HDL コレステロールを判定する場合の基準が設定されています。

「LDL コレステロールは，トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合を除き，

Friedewald 式で計算する。トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合は、non-HDL コレステロール値を用いて評価する。ただし、LDL コレステロールの直接測定法も可。」となっています。とりまとめますと、

(1)トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合

LDL コレステロールの代わりに、non-HDL コレステロールで判定します。

(2)トリグリセライド 400mg/dl 未満かつ空腹時採血の場合

non-HDL コレステロールの値を判定に用いず、LDL コレステロール値で判定します。ただし、LDL コレステロール、中性脂肪、HDL コレステロールがすべて A 判定で、non-HDL コレステロールのみが A 区分でない場合は脂質判定を B 判定とします。なお総コレステロールは non-HDL コレステロール算定のために使用し、判定は行いません。

### 3-2 子宮頸部細胞診

「検体は医師採取のみとし、自己採取は認めない」を追記引用します。

<https://www.ningen-dock.jp/14185>

項目		A異常なし	B軽度異常	C要再検査・生活改善 *1	D要精密検査・治療 *2	E治療中 *11
体格指数 (BMI) kg/m <sup>2</sup>		18.5-24.9		18.4以下, 25.0以上		
腹 囲 cm	男性	84.9以下		85.0以上		
	女性	89.9以下		90.0以上		
血 圧 mmHg *1 (2回測定:平均値)	収縮期	129以下	130-139	140-159	160以上	
	拡張期	84以下	85-89	90-99	100以上	
心拍数 (仰臥位) 回/分		45-85		40-44, 86-100	39以下, 101以上	
視力 (裸眼, 矯正両方の場合は矯正で判定) (悪い側で判定)		1.0以上		0.7-0.9	0.6以下	
聴 力 dB	1000Hz	30以下		35	40以上	
	4000Hz	30以下		35	40以上	
呼吸機能 (スパイロメトリー) 小数点1ケタ表記に変更 *3	1秒率 (%)	70.0以上			69.9以下	
	%1秒量 (予測1秒量に 対する%)	80.0以上 (1秒率70.0%以上)		79.9以下 (1秒率70.0%以上) または 80.0以上 (1秒率69.9%以下)	79.9以下 (1秒率69.9%以下)	
	%肺活量 (%)	80.0以上			79.9以下	
総たんぱく g/dL		6.5-7.9	8.0-8.3	6.2-6.4	6.1以下, 8.4以上	
アルブミン g/dL *4		3.9以上		3.7-3.8	3.6以下	
クレアチニン mg/dL (eGFRを優先して判定) (小数点2ケタ表記に変更)	男性	1.00以下	1.01-1.09	1.10-1.29	1.30以上	
	女性	0.70以下	0.71-0.79	0.80-0.99	1.00以上	
eGFR (mL/分/1.73m <sup>2</sup> による) (小数点1ケタ表記に変更)		60.0以上		45.0-59.9	44.9以下	
尿酸 mg/dL		2.1-7.0	7.1-7.9	2.0以下, 8.0-8.9	9.0以上	
HDLコレステロール mg/dL		40以上		35-39	34以下	
non-HDLコレステロール mg/dL *5		90-149	150-169	170-209	89以下, 210以上	
LDLコレステロール mg/dL		60-119	120-139	140-179	59以下, 180以上	
中性脂肪 (トリグリセライド) mg/dL *6		30-149	150-299	300-499	29以下, 500以上	
AST (GOT) U/L		30以下	31-35	36-50	51以上	
ALT (GPT) U/L		30以下	31-40	41-50	51以上	
γ-GT (γ-GTP) U/L		50以下	51-80	81-100	101以上	
FPG (血糖) 空腹時血糖 mg/dL		FPG:99以下 かつ HbA1c:5.5以下	1)FPG:100-109かつHbA1c:5.9以下 2)FPG:99以下かつHbA1c:5.6-5.9 1),2)のいずれかのもの	1) FPG:110-125 2) HbA1c:6.0-6.4 3) FPG:126以上かつHbA1c:6.4以下 4) FPG:125以下かつHbA1c:6.5以上 1)~4)のいずれかのもの	FPG:126以上 かつ HbA1c:6.5以上	
HbA1c (NGSP) % *7						
白血球数 10 <sup>3</sup> /μL		3.1-8.4	8.5-8.9	9.0-9.9	3.0以下, 10.0以上	
血色素量 g/dL	男性	13.1-16.3	16.4-18.0	12.1-13.0	12.0以下, 18.1以上	
	女性	12.1-14.5	14.6-16.0	11.1-12.0	11.0以下, 16.1以上	
血小板数 10 <sup>4</sup> /μL		14.5-32.9	12.3-14.4, 33.0-39.9	10.0-12.2	9.9以下, 40.0以上	
CRP mg/dL (小数点2ケタ表記に変更)		0.30以下	0.31-0.99		1.00以上	
梅毒反応		陰性			陽性	
HBs抗原		陰性			陽性	
HCV抗体		陰性			陽性	

項目	A異常なし	B軽度異常	C要再検査・生活改善 *1	D要精密検査・治療 *2	E治療中 *11
尿蛋白	(-)	(±)	(+) *8	(2+) 以上	
尿潜血	(-)	(±)	(+) *8	(2+) 以上	
尿糖	(-)	(±) 以上			
尿沈渣 *9					
便潜血 2日法 1日目・2日目	(-)			いずれか (+)	
子宮頸部細胞診 *10	ベセスダ分類 NILM		不適正標本=判定不能 **10 (すみやかに再検査)	ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL/CIN2, HSIL/CIN3, SCC, AGC, AIS, Adenocarcinoma, Other malign	

- \*1 C要経過観察の表現を改訂する。Xか月後など再検査時期を明記し、受診者行動を明確に指示する。画像検査・生理検査などは1年後の再検査としてもよい  
なお経過観察、定期的検査、症状あれば受診、などの不明瞭な記載は行わない 血圧は健診機関での再検査よりも家庭血圧測定を推奨する
- \*2 D要医療の表現を改訂する。精密検査を行うか、治療を行うかは、紹介先が決定することになるためD1, D2を併合する。値の高低・所見によって要精密検査、要治療を使い分けしてもよい
- \*3 呼吸機能検査は検者、被験者の良好の関係が数値を微妙に変えるので注意する  
また、1秒率、%1秒量の組み合わせで閉塞性障害の重症度を判定する  
1秒率が70%未満かつ%1秒量80%以上が軽症、79%以下が中等症以上と判定する  
1秒率、%肺活量の組み合わせで閉塞性、拘束性、混合性換気障害と判定する
- \*4 アルブミンのBCG法とBCP改良法の差異は以下を参照  
<http://www.jslm.org/others/news/20131225albumin.pdf>
- \*5 (1)トリグリセリド400mg/dl以上や食後採血の場合: LDLコレステロールの代わりに、non-HDLコレステロールで判定する  
(2)トリグリセリド400mg/dl未満かつ空腹時採血の場合: non-HDLコレステロールの値を判定に用いず、LDLコレステロール値で判定する  
ただし、LDLコレステロール、中性脂肪、HDLコレステロールがすべてA判定で、non-HDLコレステロールのみがA区分でない場合は脂質判定をB判定とする  
なお、総コレステロールはnon-HDLコレステロール算定のために使用し、判定は行わない
- \*6 血糖・脂質に影響を与えるために空腹時採血を前提としている
- \*7 空腹時血糖、HbA1c(NGSP)併合判定C区分の1)2)と判定した場合OGTTを推奨する  
3)4)と判定した場合は、生活改善指導等を実施後その結果を短期間で再評価することが望ましい
- \*8 尿蛋白が(+)かつ尿潜血が(+)である場合は、尿蛋白をD判定とする
- \*9 尿沈渣は別表の判定区分表を参照
- \*10 採取器具は綿棒ではなくブラシ、へら、サイトピック等を使用し、可能であれば液状化検体法(LBC)にて検体を保存する  
子宮頸部細胞診の検体は医師採取のみとし、自己採取は認めない (引用)<https://www.ningen-dock.jp/14185>
- \*\*10 不適正標本はすみやかに再検査。ASC-USはHPV-DNA検査あるいは6か月後、12か月後の反復細胞診、またはコルポスコピーによる精密検査を実施
- \*11 治療中の場合はE判定とする
- \*\* 眼圧の基準範囲は9~20mmHgであるが、緑内障の7割がこの範囲内にあるので、判定区分を設定していない
- \*\* 総ビリルビンについては中等度までは、上昇に比例して死亡率の減少、動脈硬化予防となるので判定区分を設定していない
- \*\* 2020年度からALPはJSCC法からIFCC法に変更され、血液型の影響は少なくなったが、閉経の影響については記載がないため  
2022年4月現時点ではALPの判定区分を従来通り作成していない  
参照 <http://jscc-jp.gr.jp/file/2019/alpld2.pdf> / <http://jscc-jp.gr.jp/file/2019/alpld4.pdf>
- \*\*胸部X線、上部消化管エックス線、上部消化管内視鏡、腹部超音波、心電図、眼底の画像健診判定マニュアルについては、日本人間ドック学会ホームページを参照

### 尿沈渣 判定区分

種類	説明	判定	A	B	C	D
赤血球 *	腎尿路疾患および全身性の出血疾患の一部にみられます。判定は算定数(以下同様)です。	C~D	5未満/HPF		5-9/HPF	10-/HPF
白血球	尿路系の細菌性感染症にみられます。	B~D	5未満/HPF	5-9/HPF	10-/HPF 尿路系の臨床 症状がある時	
尿管上皮細胞	腎臓内の尿管上皮細胞が剥離したもので、腎臓疾患にみることが多いです。	D	1未満/HPF			1-/HPF
尿路上皮細胞	腎臓の一部~尿管~膀胱~尿道の一部にかけての細胞が剥離したものです。	B	1未満/HPF	1-/HPF		
扁平上皮細胞	外尿道口付近の上皮細胞が剥離したものです。	B	1未満/HPF	1-/HPF		
卵円形脂肪体	ネフローゼ症候群などの腎疾患に伴って出現する脂肪顆粒を含む細胞です。	D	0/WF			1-/WF
細胞質内封入体細胞	尿路系の炎症時に出現する変性細胞です。	D	1未満/HPF			1-/HPF
核内封入体細胞	ヘルペスウイルス、サイトメガロウイルスなどのDNAウイルス感染により出現する細胞です。	D	0/WF			1-/WF
異型細胞	がんを疑う細胞です。	D	0/WF			1-/WF
円柱	円柱は辺縁が並行で両端が丸くなったもので、腎疾患の目安です。下記のように多くの種類があります。					
硝子円柱	タンパクの一種が尿管腔で貯留したもので、健康人でも激しい運動後にみることがあります。	B~C	0/WF	1-4/WF	5-/WF	
上皮円柱	尿管の傷害により剥離した尿管上皮細胞が封入された円柱です。	D	0/WF			1-/WF
顆粒円柱	顆粒成分(円柱内に封入された細胞が変性したもの)が封入された円柱です。	D	0/WF			1-/WF
ろう様円柱	尿管腔の長期閉塞により顆粒円柱が徐々に崩壊した太い円柱で、慢性腎不全にみることがあります。	D	0/WF			1-/WF
脂肪円柱	脂肪顆粒や卵円形脂肪体を含んだ円柱です。尿タンパク量が多い場合にみられます。	D	0/WF			1-/WF
赤血球円柱	腎臓(糸球体)で出血があった時にみることの多い赤血球を含有した円柱です。	D	0/WF			1-/WF
白血球円柱	白血球を多く含んだ円柱で、糸球体腎炎や腎盂腎炎の活動が考えられます。	D	0/WF			1-/WF
空胞変性円柱	円柱内に大小の空胞を認める円柱で、重症の糖尿病性腎症で多く認められます。	D	0/WF			1-/WF
塩類・結晶円柱	リン酸塩や尿酸の塩類、シュウ酸カルシウム結晶などを封入した円柱です。	B	0/WF	1-/WF		
細菌	細菌がみられ、尿路感染症が疑われます。同時に白血球がなければ問題はありませぬ。	B	-	1+以上		
真菌	カビの一種で特別な治療を行わなくても消失しますが、糖尿病など免疫機能低下がある時は要注意です。	B	-	1+以上		
原虫	性感染症の原因となるトリコモナスなどの原虫があります。	D	-			1+以上

\* 尿潜血と尿赤血球の判定が異なる場合は、尿赤血球の判定を優先する。人間ドックの時点では糸球体型赤血球と非糸球体型赤血球の区別は行わなくてもよいが、再検査・精密検査の時点では実施が望ましい。

略語  
HPF (high power field)、WF (whole field)